

Producent: Agriculture Sciences, Inc., 3227 Garden Brook Dr., Dallas, Texas 75234, USA

Podmiot wprowadzający produkt do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

“SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i wspólnicy sp. j. Świerkówki 15A, 64-605 Wargowo, tel. 61 29 72 600, fax 61 29 72 602, www.sumin.com.pl, e-mail: sumin@sumin.com.pl

Produkt wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

NEMASTYM®

Preparat zawierający wyselekcjonowane naturalne wyciągi roślinne, wpływające na aktywność pożytecznych mikroorganizmów glebowych, zwiększając dostępność składników pokarmowych, w tym azotu i fosforu.

Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny nr PZH/FT – 3775/2021.

ZAWARTOŚĆ: roztwór wodny naturalnych wyciągów roślinnych pozyskanych z tkanek *Quercus falcata*, *Opuntia lindheimeri*, *Rhus aromatica*, *Rhizophoria mangle*.

PRZEZNACZENIE: Nemastym® jest naturalnym preparatem, skutecznie zwiększającym aktywność i liczbę pożytecznych mikroorganizmów glebowych, a także poprawiającym strukturę i przesiąkalność gleby. Dzięki swojemu unikalnemu, przyjaznemu środowisku składowi polecany jest szczególnie przy pielęgnacji ogrodów przydomowych. Nemastym® nadaje się do regularnej pielęgnacji wszelkich roślin ozdobnych w gruncie, skrzynkach balkonowych lub w doniczkach, warzywnych, drzew i krzewów owocowych a także do roślin rabatowych i trawników.

Rozrost strefy korzeniowej roślin po zastosowaniu preparatu Nemastym® wpływa na lepsze pobieranie wody zwłaszcza w okresach jej niedoboru, poprawia wygląd roślin oraz ich walory użytkowe zwłaszcza walory dekoracyjne roślin ozdobnych. Efekty działania Nemastym® są widoczne w miarę rozwoju pożytecznych organizmów glebowych, systemu korzeniowego i całej rośliny, zwłaszcza w trudnych warunkach uprawy. Nemastym® nie jest nawozem, ale zwiększa dostępność składników odżywczych. Chroni środowisko naturalne przed nadmiernym stosowaniem nawozów sztucznych.

STOSOWANIE

Nemastym® należy stosować bezpośrednio na powierzchnię gleby w formie opryskiwania (np. opryskiwaczem ręcznym) lub podlewania (np. konewką).

Stosować minimum 0,8 l cieczy użytkowej na każde 10 m² opryskiwanej lub podlewanej powierzchni, unikając przekraczania zalecanych dawek preparatu na jednostkę powierzchni podanych w dziale ZAKRES STOSOWANIA. Po zastosowaniu zaleca się niewielkie podlanie powierzchni wodą w celu zapewnienia wnikięcia produktu do strefy korzeniowej. Zastosowanie Nemastym® poprzez systemy nawadniające może zastąpić opisane wcześniej podlewanie lub opryskiwanie gleby. Nemastym® może być stosowany przez zraszacze lub nawadnianie kropelkowe (mikro zraszacze, taśmy kroplujące, linie kroplujące), które należy dokładnie skalibrować przed każdym zastosowaniem. System nawadniający powinien zapewniać maksymalną jednorodność podawanego roztworu, aby uniknąć obniżenia jego skuteczności. Po dodaniu Nemastym® do wody, sporządzany roztwór dokładnie wymieszać. Optymalny efekt stosowania uzyskuje się dodając roztwór Nemastym® w końcowej fazie cyklu nawadniania, aby system wprowadził go w całości do strefy korzeniowej roślin przed jego wyłączeniem. Nemastym® może być stosowany we wszelkich uprawach polowych, pod osłonami, w szklarniach lub roślinach uprawianych w pojemnikach.

ZAKRES STOSOWANIA

1. ZIOŁA I WARZYWA O KRÓTKIM CYKLU ROZWOJU uprawiane w gruncie, pojemnikach i pod osłonami, np.: bazylia, sałata, rukola, rzodkiewka i inne.

Stosować 2 tygodnie po wykiełkowaniu nasion lub zaraz po posadzeniu rozsady.

Zalecana dawka: 1 ml preparatu na 10 m² (0,1 ml na 1 m²)

Liczba zastosowań w sezonie: 1

2. WARZYWA O DŁUGIM OKRESIE ROZWOJU uprawiane w gruncie, pojemnikach i pod osłonami, np.: pomidor, ogórek, marchew, pietruszka, cukinia, fasola, rośliny kapustne i inne.

Stosować zaraz po posadzeniu rozsady lub 2 tygodnie po skiełkowaniu nasion, następnie po 45 dniach.

Zalecana dawka: 1 ml preparatu na 10 m² (0,1 ml na 1 m²)

Liczba zastosowań w sezonie: 2

3. DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE uprawiane w gruncie, np.: jabłoń, borówka, malina, truskawka i inne.

Stosować zaraz po posadzeniu krzewów, a następnie po 45 - 60 dniach.

Zalecana dawka: 1- 1,5 ml preparatu na 10 m² w przypadku roślin młodych, 1,5-2 ml na 10 m² w przypadku roślin dwuletnich i starszych.

Liczba zastosowań w sezonie: 2

4. ROŚLINY BALKONOWE uprawiane w pojemnikach, w gruncie i pod osłonami, np. : pelargonia, petunia, surfinia , lobelia i inne.

Stosować zaraz po posadzeniu sadzonek, a następnie w odstępach 30-45 dniowych.

Zalecana dawka: 1 ml preparatu na 10 m² (0,1 ml na 1 m²)

Zalecana dawka dla roślin w pojemnikach balkonowych o wymiarach 100 cm x 10 cm (0,1 m²) wynosi 0,01 ml.

Liczba zastosowań: 3 razy w sezonie

5. JEDNOROCZNE ROŚLINY RABATOWE uprawiane w gruncie i pod osłonami, np.: akksamitka, szalwia, begonia i inne.

Stosować zaraz po posadzeniu rozsady, a następnie po 30 - 40 dniach.

Zalecana dawka: 1 ml preparatu na 10 m² (0,1 ml na 1 m²)

Liczba zastosowań w sezonie: 2

6. KRZEWY OZDOBNE KWITNĄCE, IGLASTE I LIŚCIASTE uprawiane w pojemnikach, gruncie i pod osłonami, np.: róża, tawuła, hortensja, tuja, cyprysik, bukszpan i inne.

Stosować zaraz po posadzeniu krzewów, a następnie w odstępach 45 dniowych.

Zalecana dawka: 1,5 ml preparatu na 10 m² w przypadku roślin młodych, 1,5-2 ml na 10 m² w przypadku roślin dwuletnich i starszych.

Liczba zastosowań w sezonie: 2 razy w uprawie krzewów liściastych, do 3 razy w uprawie krzewów iglastych. Efekt działania widoczny szczególnie na glebach niskiej jakości po 2-3 krotnym zastosowaniu w uprawie iglaków.

7. TRAWNIKI

Stosować 2 tygodnie po wysiewie nasion lub ułożeniu trawnika z rolki, a następnie po 45 dniach.

Stosować na ułożonych trawnikach podczas wychodzenia ze stanu uśpienia.

Zalecana dawka: 1 - 1,5 ml preparatu na 10 m².

Liczba zastosowań w sezonie: 2

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie zaleca się stosowania preparatu przed upływem 7 dni po użyciu fungicydów i bakteriocydów oraz przynajmniej 21 dni po sterylizacji gleby.
2. Nie przekraczać zalecanych dawek i liczby zastosowań w sezonie.
3. Nemastym® nie stwarza zagrożenia dla zdrowia w przypadku stosowania zgodnie z przeznaczeniem i w zalecanych dawkach. W przypadku wystąpienia specyficznych reakcji alergicznych należy skontaktować się z lekarzem.
4. Chronić przed dziećmi i innymi osobami niepowołanymi. Unikać kontaktu ust, skóry i oczu z preparatem. Nie spożywać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
5. Rozcieńczyć produkt, ustalając dokładnie jego ilość. Odmierzoną ilość preparatu wlać do opryskiwacza (konewki) napełnionego do połowy wodą. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza (konewki) z cieczą roboczą, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po pracy opryskiwacz i sprzęt użyty do sporządzania roztworu dokładnie wymyć. Nie zanieczyszczać wód preparatem lub jego opakowaniem.
6. Preparat przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub karmą dla zwierząt, w temperaturze +1°C do +30°C.
7. Opróżnione opakowania traktować jako odpad komunalny.

PIERWSZA POMOC. Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -