

SUMIN KOLORADOCONTROL

Mikrobiologiczny preparat, w formie proszku, zawierający wyselekcjonowane szczepy bakterii, które stwarzają niekorzystne warunki do bytowania oraz żerowania w uprawach niepożądanych owadów i ich larw, zwłaszcza stonki ziemniaczanej, gąsienic motyli oraz przędziorka chmielowca w warzywach. Obecne w produkcie mikroorganizmy, kolonizując strefę korzeniową, wspomagają procesy regeneracyjne roślin, ich rozwój oraz odporność na czynniki stresowe. Preparat przeznaczony jest do stosowania w uprawach gruntowych i pod osłonami.

Zalety stosowania produktu Sumin KoloradoControl

- Ogranicza straty w plonach spowodowane przez szkodliwe owady i ich larwy
- Nie kumuluje się w roślinach i glebie
- Przyjazny dla środowiska
- Jak większość preparatów mikrobiologicznych, nie powoduje uodpornień u owadów

Instrukcja stosowania

Sumin KoloradoControl należy używać prewencyjnie lub interwencyjnie, 1-2 krotnie od wiosny do jesieni, zwłaszcza gdy gleby użytkowane są w monokulturze, a także przy zwiększonym ryzyku wystąpienia czynników stresowych w uprawach. Najlepszy efekt skuteczności uzyskuje się stosując preparat we wczesnych stadiach rozwoju larw szkodliwych owadów.

Optymalną temperaturą powietrza dla działania preparatu, jest zakres od +13°C do +30°C. Opryski należy wykonywać rano, wieczorem lub w dni pochmurne. Nie stosować podczas intensywnego nasłonecznienia.

W celu przygotowania cieczy roboczej, najlepiej stosować niechlorowaną i nieozonowaną wodę, o temperaturze otoczenia. Można również użyć wodę kranową, ale „odstałą” przez 24 h w temperaturze otoczenia.

Ciecz roboczą należy zużyć do 6-ciu godzin po przygotowaniu.

Zalecane dawkowanie przedstawiono w poniższej tabeli:

Uprawa	Stwarzanie niekorzystnych warunków do bytowania oraz żerowania szkodników	Dawkowanie
Kapusta i inne warzywa	Tantniś krzyżowiaczek, Bielek kapustnik, Piętnówka kapustnica i inne szkodliwe gąsienice motyli	5-10 g środka na 1,25-2,5 l wody/25 m ² powierzchni uprawy
Ziemniaki, pomidory, bakłażany, papryka	Stonka ziemniaczana (larwy I-III stadium rozwojowego)	6-10 g środka na 1-2 l wody/20 m ² powierzchni uprawy

Drzewa i krzewy owocowe oraz ozdobne	Namietnik jabłoniowy, Bielinek rzepnik, Owocówka jabłkóweczka, Piędzik przedzimek, Kuprówka rudnica i inne szkodliwe gąsienice motyli	7-10 g środka na 0,8-1,6 l wody/17 m ² powierzchni uprawy
Winogrona	Zwójkówki	7-10 g środka na 0,4-0,8 l wody/8 m ² powierzchni uprawy
Ogórki w szklarniach i inne warzywa	Przędziorek chmielowiec	7,5-10 g środka na 0,4-0,8 l wody/8 m ² powierzchni uprawy
Sadzonki roślin (zaprawianie)	Muchówka śmietki kapuścianej	7,5-10 g środka na 0,25-0,4 l wody

Skład produktu

Wyselekcjonowany szczep bakterii *Bacillus* sp.

Warunki przechowywania

Produkt należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od -5°C do +25°C, w ciemnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu preparat należy szczelnie zamknąć. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od artykułów spożywczych, pasz, środków ochrony roślin oraz leków.

Okres ważności

24 miesiące przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania.

Środki ostrożności

Preparat nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Jest nietoksyczny i nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt. Produkt nie nadaje się do spożycia. W przypadku niezamierzonego spożycia i wystąpienia objawów chorobowych należy skontaktować się z lekarzem. W trakcie wykonywania zabiegów zaleca się stosować rękawice i odzież ochronną.

Podmiot wprowadzający produkt do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Biofeld Sp. z o. o.

ul. Roźwienicka 43

37-500 Widna Góra

Konfeksjoner:

„Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. j.

Świerkówki 15a

64 – 605 Wargowo

www.sumin.com.pl

Masa netto:

Data produkcji:

Nr partii: