

SUMIN TRUTKA GRANULOWANA

Przynęta przeznaczona do zwalczania gryzoni (myszy i szczury), w postaci granulatu, gotowa do użycia

Do stosowania wyłącznie w zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem stacjach deratyzacyjnych

SKŁAD

Substancja czynna:

Brodifakum

0,0025g/ 100g

Produkt zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia oraz barwnik.

Może powodować uszkodzenie narządów (krew) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI/ lekarzem. W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów



UWAGA

Właściciel pozwolenia:

Kollant S.r.l., Via C.Colombo, 7/7A, 30030 Vigonovo, Włochy , tel: +39 049 9983000

Pozwolenie nr PL/2019/0384/MR/SBP

Partia Nr..... Z

Termin ważności:

Zawartość netto:

Przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od światła słonecznego, w miejscu niedostępnym dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych i hodowlanych.

INSTRUKCJE OBSŁUGI, DAWKOWANIE

Przed zastosowaniem produktów gryzoniobójczych należy rozważyć zastosowanie niechemicznych metod kontroli (np. pułapek). Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń zamieszczonych w materiałach informacyjnych dołączonych do produktu lub informacji przekazanych w punkcie sprzedaży. Przed zastosowaniem produktu nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż może mieć to wpływ na zachowanie zwierząt i spożycie przynęty. Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla gryzoni (np. rozsypane ziarno lub pozostałości żywności). W celu zwiększenia spożycia przynęty oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownej infestacji należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. zatykanie otworów, usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu dla gryzoni). Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych, zwierząt hodowlanych i zwierząt innych niż docelowe, z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt oraz z dala od przyborów kuchennych i powierzchni mających z nimi kontakt. Stacje powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, w których zaobserwowano aktywność gryzoni (np. ścieżki, miejsca gniazdowania, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych, otwory, nory itp.). Tam gdzie jest to możliwe, stacje deratyzacyjne należy przytwierdzić do podłoża lub innych struktur. Stacje należy wyraźnie oznakować zgodnie z zaleceniami dla produktu.

Nie umieszczać stacji w pobliżu miejsc, w których mogą mieć one kontakt z wodami powierzchniowymi. Nie wyjmować przynęty z saszetek.

Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 2-3 dni w przypadku zwalczania myszy i co 5-7 w przypadku szczurów, na początku okresu zwalczania gryzoni, później przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz wyszukiwania i usunięcia padłych gryzoni. Skutki zastosowania produktu można zaobserwować po upływie 4-10 dni po spożyciu przynęty. Zjedzoną przez gryzonia przynętę należy uzupełnić. Przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną należy wymienić. Stacje deratyzacyjne należy rozmieszczać w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem.

Nie stosować produktu bezpośrednio do nor gryzoni.

Zalecane dawki to:

Mysz domowa, stosowanie wewnątrz budynków:

20-40 g na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż 1 stacja, min odległość pomiędzy stacjami to 5m.

Szczur wędrowny, stosowanie wewnątrz i wokół budynków:

100-200 g na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż 1 stacja, min odległość pomiędzy stacjami to 5m.

Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem. Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć stacje deratyzacyjne oraz przynętę znaną poza stacjami.

Środki ochrony środowiska:

W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać (mechanicznie) unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (spalarnie). Produkt niebezpieczny dla dzikich zwierząt.

Środki zmniejszające ryzyko:

Nie należy stosować produktu w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły (np. w celu zapobiegania infestacji gryzoni lub wykrycia ich aktywności).

W przypadku stosowania produktów gryzoniobójczych zawierających antykoagulanty, gryzoni powinny zostać zwalczone w ciągu 35 dni. Jeśli po tym okresie aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy powiadomić dostawcę/sprzedawcę produktu lub skonsultować się z profesjonalną firmą zajmującą się deratyzacją.

Padłe gryzonie usuwać w sposób bezpieczny (stosując rękawice ochronne lub narzędzia np. szczypce) i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

Skutki uboczne/działania niepożądane:

Produkt zawiera substancję należącą do grupy antykoagulantów. W przypadku spożycia objawy mogą wystąpić z opóźnieniem i obejmują krwawienie z nosa i z dziąseł. W ciężkich przypadkach może dochodzić do powstawania siniaków oraz obecności krwi w kale i moczu.

Antidotum: Witamina K1 podawana wyłącznie przez personel medyczny/weterynaryjny.

Pierwsza pomoc:

W przypadku:

- kontaktu ze skórą: słuścić skórę wodą, a następnie umyć wodą z mydłem.
- kontaktu z oczami: przemyć oczy roztworem do przepłukiwania oczu lub wodą, a następnie utrzymać powieki otwarte przez co najmniej 10 minut.
- kontaktu z jamą ustną: ostrożnie przepłukać jamę ustną wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać opakowanie produktu lub etykietę.

W przypadku spożycia produktu przez zwierzę domowe należy skontaktować się z lekarzem weterynarii. Oznakowania na stacjach deratyzacyjnych muszą zawierać następujące informacje: „Nie przenosić ani nie otwierać”; „Zawiera substancję gryzoniobójczą”; „Nazwa produktu lub nr pozwolenia”; „Substancja(-e)

czynna(-e)” i „W razie wypadku skontaktować się z ośrodkiem kontroli zatruc (Gdańsk (58) 301-65-16, Kraków (12) 411-99-99, Poznań (61) 847-69-46, Warszawa (22) 619-08-97)”.

Usuwanie: Opakowania po produkcie, pozostałości produktu po zastosowaniu (w tym przynętę znaną poza stacją deratyzacyjną) zamknięte w oznakowanym pojemniku, usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych. Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.