

Sumin MultiRoots

Produkt przeznaczony jest do aktywacji i wspomagania procesu ukorzenia: sadzonek i cebul roślin ozdobnych, sadzonek warzyw oraz drzew i krzewów. Do stosowania przed i po wysadzeniu w miejsca stałe. Preparat dzięki zawartości kwasów humusowych posiada również zdolność aktywnego inicjowania oraz wspierania procesu kiełkowania nasion, aktywuje zarodek oraz wspomaga wzrost siewki. W związku z tym znacznie poprawia siłę kiełkowania oraz kondycję rośliny w początkowej fazie wzrostu.

Zalety stosowania produktu MultiRoots:

- działa stymulująco na rozwój korzeni, w szczególności korzeni włośnikowych
- wzmacnia energię kiełkowania
- poprawia wyrównanie kiełkowania nasion oraz wschody
- ułatwia pobieranie składników pokarmowych poprzez zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych korzeni
- stymuluje wzrost i rozprzestrzenianie się organizmów glebowych takich jak drożdże i algi, w strefie wokół korzeni
- ogranicza wpływ negatywnych skutków uprawy gleby, takich jak zasolenie czy zanieczyszczenie środkami ochrony roślin
- ogranicza stres związany z przesadzaniem roślin
- dodawany do nawozów dolistnych poprawia ich przyswajalność
- wspomaga wegetację roślin po okresie zimowym
- może być stosowany we wszystkich rodzajach roślin warzywniczych, sadowniczych oraz rolniczych

Skład:

- ekstrakt humusowy pochodzący z leonardytu: 25% m/m
- huminy, kwasy ulmowe, kwasy humusowe: 20,5% m/m
- kwasy fulwowe: 4,5% m/m
- zawartość substancji organicznej: min. 20%

pH produktu: 3,2-4,7

Instrukcja stosowania

Uprawa	Dawki i terminy stosowania
Rośliny ozdobne: sadzonki zielone, sadzonki półzdrewniałe oraz zdrewniałe (np. tuje, cyprysiki, cisy, róże, hortensje ogrodowe, clematisy itp.) oraz cebule kwiatowe	Podlać lub moczyć korzenie sadzonek/cebule kwiatowe przed wysadzeniem używając produkt w dawce 2,5 ml/1 l wody.
Nasiona roślin	Opryskać nasiona bezpośrednio po siewie (przed przykryciem ich ziemią) używając produkt w dawce 4 ml/1 l wody
Sadzeniaki	Namoczyć na 24 h przed sadzeniem używając produkt w dawce 2,5 ml/1 l wody.
Warzywa z rozsady (sałata, kalarepa, kapusta, pomidor, papryka, rośliny dyniowate)	Moczyć lub podlać korzenie rozsady przed wysadzeniem używając produkt w dawce 2,5 ml/1 l wody. Ok. 14 dni po wysadzeniu rozsady w ziemię stosować oprysk dolistny w dawce 20 ml/3-5 l wody/100 m² powierzchni uprawnej. W przypadku stosowania produktu przez system irygacyjny stosować dawkę 25 ml/10 l wody, zabieg można powtórzyć po ok. 14 dniach.
Marchew, pietruszka	Pierwszy zabieg wykonać gdy nać osiągnie 10-15 cm, drugi zabieg powtórzyć po 2-3 tygodniach. Stosować oprysk dolistny w dawce 10 ml/4-5 l wody/100 m² powierzchni uprawnej.
Ziemniaki	Pierwszy zabieg wykonać gdy rośliny osiągną 20-25 cm, kolejny zabieg powtórzyć po 2-3 tygodniach. Stosować oprysk dolistny w dawce 20 ml/4-5 l wody/100 m² powierzchni uprawnej.

Truskawki	Nowe nasadzenia Moczyć korzenie sadzonki przed wysadzeniem używając produkt w dawce 2,5 ml/1 l wody. 2 tygodnie po wysadzeniu stosować oprysk dolistny w dawce 20 ml/4-5 l wody/100 m² powierzchni uprawnej. W drugim lub trzecim roku uprawy Zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji stosując oprysk dolistny w dawce 20 ml/4-5 l wody/100 m² powierzchni uprawnej. Kolejny zabieg powtórzyć po ok. 15 dniach.
Sady	Nowe nasadzenia Moczyć korzenie drzewek przed wysadzeniem stosując dawkę 2,5 ml/1 l wody. Po ruszeniu wegetacji Podlewać produktem w dawce 25 ml/10 l wody na każde drzewko. Dolistnie stosować wraz z nawozami i środkami ochrony roślin w dawce 5 ml/10 l wody. Łączne stosowanie z giberelinami pozwala ograniczyć dawkę giberelin o 15-20%.

UWAGA!

Przed użyciem wstrząsnąć.

Nie stosować z jakimkolwiek zwilżaczem.

Dzięki niskiemu pH (3,2-4,7) produkt można mieszać z większością znanych nawozów dolistnych i środków ochrony roślin. Jako dodatek do nawozów dolistnych (lepszego wykorzystanie nawozów) stosować w dawce 5 ml/10 l wody.

Środki ostrożności

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania. Umyć ręce wodą z mydłem po użyciu produktu. Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od dzieci, zwierząt i żywności. W przypadku połknięcia należy pilnie skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się nawozu do oczu przemyć dużą ilością wody. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

EUH208: Zawiera 1,2 benzoizotiazol-3(2H)-one. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Warunki przechowywania

Chronić przed nasłonecznieniem i przed wilgocią.

Przechowywać w temperaturze od 0 do 40°C.

Piktogramy (słońce, temperatura od 0 do +40° C, parasol, liczba warstw na palecie – 20 ml-13 warstw, 100 ml-10 warstw)

Okres ważności - 2 lata, gdy produkt przechowywany jest prawidłowo, zgodnie z instrukcją warunków przechowywania.

Sumin MultiRoots
(BlackJak®)

Wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Producent:

Sipcam Inagra S.A.
Profesor Beltrán Baguena No 5
46009 Valencia, Hiszpania

Podmiot wprowadzający nawóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

Dystrybutor:

Bio Agris Sp. z o. o. Spółka komandytowa
Ul. Lubawska 4A
03-011 Warszawa

Konfekcjoner:

„SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i wspólnicy sp. j.
Świerkówki 15A, 64-605 Wargowo
www.sumin.com.pl

Masa netto: 22,60 g (20 ml)
113 g (100 ml)

Data produkcji, numer partii: