

celny SHOT
Zestaw Dwuskładnikowy
Komary, Kleszcze

długotrwałe działanie

Dwuskładnikowy zestaw w formie koncentratu stężonej emulsji do rozcieńczania wodą.

Zawiera:

- środek owadobójczy o nazwie Aspermet 200 EC, zawierający 200 g permetryny w jednym litrze preparatu (pozwolenie nr 3869/09)

Składniki czynne/stwarzające zagrożenie: permetryna 200 g/l



Uwaga

Może powodować reakcję alergiczną skóry

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

SRODKI OSTROŻNOŚCI

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę

Chronić przed dziećmi

Unikać wdychania mgły / par / rozpylonej cieczy

Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy

Unikać uwolnienia do środowiska

Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki; Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem

Zebrać wyciek

Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi / międzynarodowymi przepisami

- adjuwant (środek pomocniczy nie klasyfikowany jako biobójczy) o nazwie Grassfil, zawierający min. 85% żywicy politerpenowej.

Obydwa składniki, zmieszane w proporcji 1:1 i rozcieńczone wodą do stężenia 2% zwalczają kleszcze na terenach otwartych.

Mieszanina składników działa kontaktowo i żołądkowo, wykazując równocześnie silne działanie repelentne.

Dodatek adjuwanta zapobiega szybkiemu zmywaniu środka z powierzchni traw, liści i igieł, co zapewnia przedłużone działanie środka na pasożyty.

ZASTOSOWANIE

Dwuskładnikowy zestaw przeznaczony jest do zwalczania komarów i kleszczy na zewnątrz budynków.

Adjuwant tworzy pod wpływem światła słonecznego film polimerowy, umożliwiający utrzymywanie się substancji biologicznie aktywnej (zawartej w preparacie Aspermet 200 EC) na liściach, źdźbłach i końcówkach traw w dłuższym przedziale czasowym.

ZWALCZANIE KOMARÓW i KLESZCZY (produktem biobójczym Aspermet 200EC)

DAWKOWANIE (Komary)

Zabieg ULV („zimna mgła”): Sporządzić 5% roztwór wodny preparatu Aspermet 200 EC. Część użytej do sporządzenia roztworu wody **zaleca się** zastąpić nośnikiem stosowanym w zabiegach ULV, który poprawia efekt skuteczność „zimnej mgły”. 10 litrów cieczy roboczej wystarcza do opryskania powierzchni 1 ha.

Zabieg „gorącą mgłą”: Sporządzić ciecz roboczą rozcieńczając 0,5 litra preparatu i 0,5-1,5 litra nośnika w 5 litrach wody. Tak przygotowana ciecz robocza wystarcza do zamgławiania 1 ha powierzchni.

DAWKOWANIE (Kleszcze)

- **metoda oprysku** : sporządzić 1% roztwór Aspermetu 200EC w wodzie (100 ml preparatu w 10 litrach wody) i wymieszać intensywnie. Stosować w dawce 1 l roztworu roboczego na 20 m² powierzchni

ZWALCZANIE KLESZCZY (zestawem dwuskładnikowym)

DAWKOWANIE

Zalecane stężenie cieczy użytkowej: 2% (100 ml Aspermetu i 100 ml Grassfilu w 10 l wody). Jeden litr płynu roboczego wystarcza na opryskanie ok. 20 m² powierzchni.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Do opryskiwacza o pojemności 10 litrów wlać ok. 1/3 l wody. Z opakowania jednostkowego produktu biobójczego Aspermet 200 EC po wymieszaniu jego zawartości odmierzyć 100 ml preparatu, wprowadzić do

zbiornika opryskiwacza i intensywnie wymieszać jego zawartość. Następnie wlać 100 ml adjuwanta (Grassfil)

Uzupełnić wodę do wymaganej objętości opryskiwacza i ponownie dokładnie wymieszać do uzyskania pełnej emulsji.

Niezwłocznie wykonać zabieg. Zawartość 10 litrowego zbiornika opryskiwacza wystarcza do opryskania ok. 200

m² powierzchni. Oczywiście sporządzanie cieczy użytkowej można wykonać w opryskiwaczu innej pojemności pod warunkiem zachowania odpowiednich proporcji wykorzystywanych substancji.

SPOSÓB WYKONYWANIA ZABIEGU

Stosować oprysk grubokroplisty. Zwracać uwagę na konieczność pokrycia cieczą użytkową górnych części

źdźbeł traw i chwastów. Unikać wykonywania zabiegu w dni deszczowe i pochmurne tuż przed spodziewanymi

opadami deszczu, który może spowodować splukiwanie naniesionej w wyniku oprysku warstwy preparatu, co

może ograniczyć jego trwałość.

UWAGA! Środek toksyczny dla pszczoł!

Nie stosować w pobliżu pasiek pszczelich. Stosować w późnych porach wieczornych lub wczesnym rankiem.

(poza oblotami pszczoł)

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 0 – 30°C

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku

Przechowywać w miejscach zaciemnionych.

Nie dopuścić do przemarznięcia środka

POMOC MEDYCZNA:

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w ostrzeżeniach

skontaktować się z najbliższym Centrum Informacji Toksykologicznej w Polsce: Gdańsk (058)349-28-31, Kraków

(012)411-99-99, Poznań (061)847-69-46, Warszawa (022)619-66-54

Zawartość netto: 2x 20ml, 2x 50ml , 2x100 ml

Okres ważności – 3 lata

Data produkcji:..... Nr partii:.....

Producent/podmiot odpowiedzialny : ASPLANT-SKOTNICCY Sp. J., 43-600 Jaworzno ul. Chopina 78 A
tel./fax: 48 32 753-09-17, -33, -87

e-mail: biuro@asplant.com.pl, www.asplant.com.pl

Dystrybutor. „SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp.J, 64-605 Wargowo, Świerkówki 15A

tel.61 29 72 600, www.sumin.com.pl

Przed użyciem zapoznać się z pełną treścią etykiet poszczególnych składników zestawu znajdujących się wewnątrz opakowania.