

Posiadacz zezwolenia:

Sharda Cropchem Ltd., 2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056, Indie, tel.: + 91 22 6261 5615, fax: + 91 22 6678 2828/ 2808, e-mail: regn@shardaintl.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
(...)

PEŁZAKOL MAX

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

fosforan żelaza (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu) – 29,7 g/kg (2,97 %)

Zezwolenie MRiRW nr R-168/2025 z dnia 14 listopada 2025 r.

EUH401	W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
--------	--

OPIS DZIAŁANIA

MOLUSKOCYD, przeznaczony do zwalczania ślimaków nagich w formie granul (GB). Mechanizm działania substancji czynnej środka - fosforanu żelaza, polega na redukcji wydzielania śluzu przez ślimaki. Po spożyciu granul ślimaki zwykle chowają się w glebie/podłożu gdzie obumierają, dlatego dowodów skuteczności środka w postaci obumarłych ślimaków jest niewiele. Ze względu na to, że efekty stosowania środka mogą nie być widoczne od razu, jego skuteczność należy mierzyć pośrednio - mniejszym rozmiarem szkód wyrządzonych przez te szkodniki w uprawach.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek jest przeznaczony do stosowania poprzez rozrzucenie ręczne lub za pomocą mechanicznego aplikatora do środków w postaci granulatu.

Truskawka i inne rośliny sadownicze za wyjątkiem winorośli (w uprawie polowej)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 g/10 m²

Termin stosowania: środek stosować po rozpoczęciu okresu wegetacji lub po posadzeniu i w późniejszym okresie wegetacji do fazy, gdy prawie wszystkie owoce osiągają ostateczną wielkość, typową dla danego gatunku (BBCH 79)

Liczba zabiegów:4

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Winorośl (w uprawie polowej)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 g/10 m²

Termin stosowania: środek stosować po posadzeniu lub po rozpoczęciu okresu wegetacji i w późniejszym okresie wegetacji do fazy początku dojrzewania jagód (jagody zaczynają się wybarwiać) (BBCH 81).

Liczba zabiegów:4

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Rośliny warzywne okopowe i bulwiaste (w uprawie polowej)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 g/10 m²

Termin stosowania: środek stosować po siewie/sadzeniu i w późniejszym okresie wegetacji do fazy, gdy część rośliny uprawnej przeznaczona do zbioru osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 49).

Liczba zabiegów:4

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Niewymagany

1. Podczas aplikacji należy zachować ostrożność, aby granulat nie pozostał na liściach, kwiatach lub innych częściach roślin, zwłaszcza w uprawie warzyw.
2. Środek jest najbardziej skuteczny w ochronie roślin jednorocznych, kiedy jest stosowany bezpośrednio po siewie/sadzeniu.
3. Najwyższą skuteczność osiąga się, wykonując zabieg przed wystąpieniem szkód. Jest to szczególnie istotne w przypadku ochrony upraw roślin jednorocznych.
4. Konieczne może być powtórzenie aplikacji, zwłaszcza w przypadku spożycia przez ślimaki granulatu lub pojawienia się kolejnych pokoleń szkodników.
5. Środek nie jest zalecany do zwalczania ślimaków żyjących w glebie, uszkadzających części podziemne roślin uprawnych, w tym bulwy i korzenie spichrzowe.
6. Nie należy stosować środka łącznie z nawozami.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na jego działanie i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne (nitrylowe).

Stosować ubranie robocze (długie spodnie, koszula z długim rękawem).

Zdjąć ubranie robocze i wyprać po użyciu.

Dokładnie umyć ręce i zanieczyszczoną skórę po użyciu.

Należy unikać niepotrzebnego kontaktu ze środkiem.

Nieprawidłowe stosowanie środka może spowodować szkody dla zdrowia.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie dotyczy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół.

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich
- w temperaturze 0°-30°C

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -